

FOOD ALLERGY & ANAPHYLAXIS EMERGENCY CARE PLAN

Nombre: _____ Fecha de nacimiento: _____

Alergia a: _____

Peso: _____ lb

Asma: Sí (mayor riesgo de reacción grave) No

En caso de una reacción alérgica a alimentos o sospecha de ello:

COLOCAR LA FOTO DEL ALUMNO AQUÍ

EN CASO DE QUE SURJA CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS GRAVES

[] Si esta opción está marcada, administre epinefrina inmediatamente si el alumno definitivamente ingirió el alérgeno, incluso si no hay síntomas.

 PULMONES Falta de aire, sibilancia, tos reiterada	 CORAZÓN Palidez, color azulado, desmayos, pulso débil, mareo	 GARGANTA Oclusión, voz ronca, dificultad para respirar/tragar	 BOCA Hinchazón significativa de la lengua o los labios
 PIEL Muchas ronchas en el cuerpo, enrojecimiento generalizado	 INTESTINO Vómitos reiterados o diarrea grave	 OTRA ÁREA Sensación de que algo malo sucederá, ansiedad, confusión	O UNA COMBINACIÓN de síntomas leves o graves de diferentes áreas del cuerpo.

ADVERTENCIA: No dependa de agentes antihistamínicos ni inhaladores (broncodilatadores) para tratar una reacción grave. Use epinefrina.

1. **INYECTE EPINEFRINA INMEDIATAMENTE.**
2. **Llame al 911.** Solicite una ambulancia que disponga de epinefrina.
 - Considere administrar más medicamentos (luego de la epinefrina o junto con la epinefrina):
 - » Agentes antihistamínicos.
 - » Inhalador (broncodilatador) si hay asma.
 - Recueste al alumno y levántele las piernas. Si el alumno tiene problemas para respirar o vomita, hágalo sentarse o recostarse sobre un lado.
 - Si los síntomas no mejoran, o regresan, pueden administrarse más dosis de epinefrina aproximadamente 5 minutos o más después de la última dosis.
 - Avise a los contactos de emergencia.
 - Lleve al alumno a la sala de emergencias incluso si los síntomas desaparecen. El alumno debe permanecer en la sala de emergencias durante más de 4 horas porque los síntomas podrían regresar.

ADVERTENCIA: SI DUDA, ADMINISTRE EPINEFRINA.

SÍNTOMAS LEVES

[] Si esta opción está marcada, administre epinefrina inmediatamente en caso de que se presente CUALQUIER síntoma si existe la posibilidad de que el alumno haya ingerido el alérgeno.

 NARIZ Picazón/secretión nasal, estornudos	 BOCA Picazón bucal
 PIEL Algunas ronchas, picazón leve	 INTESTINO Náusea leve/molestias

↓ ↓ ↓

1. **ADMINISTRAR ANTIHISTAMÍNICOS, SI ASÍ LO INDICA EL MÉDICO.**
2. Quédese con el alumno; avise a los contactos de emergencia.
3. Observe al alumno detenidamente para detectar cambios. Si los síntomas empeoran, **ADMINISTRE EPINEFRINA.**

MEDICAMENTOS/DOSIS

Marca de epinefrina: _____

Dosis de epinefrina: 0.15 mg por vía intramuscular
 0.3 mg por vía intramuscular

Agente antihistamínico de marca o agente antihistamínico genérico: _____

Dosis del agente antihistamínico: _____

Otro (p. ej., broncodilatador inhalable si el alumno es asmático): _____

FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL

FECHA

FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL MÉDICO/PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA

FECHA




DIAGNOSED AND UNDIAGNOSED

FOOD ALLERGY & ANAPHYLAXIS EMERGENCY CARE PLAN


EPIPEN® (EPINEFRINA) INDICACIONES PARA EL AUTOINYECTOR

1. Retire el autoinyector EpiPen del estuche plástico.
2. Retire la tapa de seguridad azul.
3. Coloque la punta naranja en dirección a la parte exterior media del muslo y presione firmemente.
4. Sostener durante, aproximadamente, 10 segundos.
5. Retirar el dispositivo y masajear el área durante 10 segundos.



AUVI-Q™ (INYECCIÓN DE EPINEFRINA, USP) INDICACIONES

1. Retire el estuche de Auvi-Q. Esto activará automáticamente las instrucciones de voz.
2. Retire la tapa de seguridad roja.
3. Coloque el extremo negro contra la parte exterior media del muslo.
4. Presione con firmeza y sostenga durante 5 segundos.
5. Retirar el dispositivo del muslo.



ADRENACLICK®/ADRENACLICK® INDICACIONES GENERALES

1. Retire el estuche.
2. Retire las tapas grises marcadas como "1" y "2".
3. Coloque la punta redondeada roja contra la parte exterior media del muslo.
4. Presione con firmeza hasta que penetre la aguja.
5. Sostenga durante 10 segundos. Retirar el dispositivo del muslo.



OTRAS INDICACIONES/INFORMACIÓN (puede llevar la epinefrina consigo, puede autoadministrarse la epinefrina, etc.):

Administre el tratamiento al alumno antes de llamar a los contactos de emergencia.
Los primeros signos de una reacción pueden ser leves, pero pueden empeorar rápidamente.

CONTACTOS DE EMERGENCIA: LLAME AL 911

EQUIPO DE RESCATE: _____

MÉDICO: _____ TELÉFONO: _____

PADRE/MADRE/TUTOR: _____ TELÉFONO: _____

OTROS CONTACTOS DE EMERGENCIA

NOMBRE/RELACIÓN: _____

TELÉFONO: _____

NOMBRE/RELACIÓN: _____

TELÉFONO: _____

FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL PADRE/MADRE/TUTOR

FECHA

